

Empfehlungen zu Impfintervallen für Hunde der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München; Stand: März 2018

Core-Vakzinen	Grundimmunisierung		Wiederholung
	bei Erstvorstellung < 16 Wochen	bei Erstvorstellung ≥16 Wochen	
CPV	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre oder nach Antikörpermessung (nur bei Fehlen von Antikörpern)
CDV	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	alle 3 Jahre oder nach Antikörpermessung (nur bei Fehlen von Antikörpern)
Tollwut	1 x ab 12. Lebenswoche (bei geplantem Auslandsaufenthalt ggf. 2. Impfung im Abstand von 3-4 Wochen)	1 x ab 12. Lebenswoche (bei geplantem Auslandsaufenthalt ggf. 2. Impfung im Abstand von 3-4 Wochen)	nach Herstellerangabe ((1-) 3 Jahre) (laut Tollwut-VO)
Leptospirose	ab 12. Woche 2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	2 x im Abstand von 3-4 Wochen, dann nach 1 Jahr	alle 12 Monate, möglichst im Frühjahr
Non-Core-Vakzinen	Grundimmunisierung		Wiederholung
	bei Erstvorstellung < 16 Wochen	bei Erstvorstellung ≥16 Wochen	
HCC	ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr	1 x, dann nach 1 Jahr	bei Bedarf (junge Hunde, viele Hundekontakte, z. B. Hundeschule, Hundesport, Tierheim, Tierpension) alle 3 Jahre oder nach Antikörpermessung (nur bei Fehlen von Antikörpern)
Parainfluenza	subkutan: ab 6.-8. Woche, dann im Abstand von 3-4 Wochen bis zur 16. Woche, dann nach 1 Jahr intranasal: 1 x ab 8. Woche	subkutan: 1 x, dann nach 1 Jahr intranasal: 1 x	subkutan: bei Bedarf (junge Hunde, viele Hundekontakte, z. B. Hundeschule, Hundesport, Tierheim, Tierpension) alle 3 Jahre intranasal: bei Bedarf
<i>B. bronchiseptica</i>	intranasal: 1 x ab 8. Woche	intranasal: 1 x	intranasal: bei Bedarf
CHV-1		nur bei Zuchthündinnen: während der Läufigkeit oder 7-10 Tage nach dem Decktermin, dann 1-2 Wochen vor der Geburt	nur während der Zucht
Babesiose ¹		bei Hunden in endemischen Gebieten oder mit regelmäßigen Aufenthalten im südlichen oder östlichen Ausland: ab 6 Monaten 2 x im Abstand von 3-4 Wochen	alle 12 Monate
Leishmaniose		bei Hunden mit regelmäßigen Aufenthalten im südlichen Ausland: ab 6 Monaten 3 x im Abstand von 3-4 Wochen	alle 12 Monate
Borreliose	nicht empfohlen		
Dermatophytose	nicht empfohlen		

(CPV = canines Parvovirus, CDV = canines Staupevirus, HCC = Hepatitis contagiosa canis, *B. bronchiseptica* = *Bordetella bronchiseptica*, CHV-1 = canines Herpesvirus)

¹Einfuhr über internationale Apotheke